



Anticoagulantes: instrucciones para el paciente

Si usted está tomando un medicamento anticoagulante, se le pedirá que deje de tomarlo durante un corto período antes de someterse al procedimiento. El motivo es disminuir el riesgo de hemorragia asociado a las biopsias o a la extirpación de pólipos durante el procedimiento. Asegúrese de informar al proveedor que le receta el anticoagulante que tendrá que dejar de tomarlo antes del procedimiento y asegúrese de que está de acuerdo; de lo contrario, cancelaremos o reprogramaremos su procedimiento.

Después del procedimiento, recibirá instrucciones para volver a tomar los medicamentos.

Llame al consultorio al 541-228-3330 o a Cascade Endoscopy Center al 541-726-8882 si ocurre lo siguiente:

- **No encuentra el medicamento que toma en esta lista o no está seguro de si toma un anticoagulante.**
- **No suspendió el medicamento según lo requerido o le informaron que no puede suspender el anticoagulante en este momento.**
- **¿Tiene alguna pregunta o duda?**

¿QUÉ DEBE HACER CON LA ASPIRINA y otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE)?

Suspenda todos los AINE (aspirina, Advil, Motrin, Aleve, naproxeno, ibuprofeno, celecoxib, Celebrex, diclofenac, meloxicam durante los 2 días previos al procedimiento).

Si toma una dosis COMPLETA de aspirina, 325 mg diariamente, disminuya la dosis a 81 mg durante los 5 días previos al procedimiento.

Si toma una dosis baja, 81 mg de aspirina diariamente, puede continuar haciéndolo sin suspenderla.

Medicamentos	Tiempo de espera requerido antes del procedimiento	Información adicional
Antiplaquetarios		
Plavix (clopidogrel)	5 días	
Brilinta (ticagrelor)	5 días	
Effient (prasugrel)	7 días	
Aggrenox (dipiridamol-aspirina)	3 días	
Lovenox (enoxaparina sódica)	1 día	Puede tomar su dosis habitual por la mañana del día ANTERIOR al procedimiento. Si suele tomar una dosis por la noche, comuníquese con el médico.
Cilostazol (Pletal)	5 días	
Antitrombóticos		
Coumadin/warfarina	5 días	El médico debe revisar y determinar si necesita un tratamiento anticoagulante perioperatorio para suspender este medicamento.
Pradaxa (dabigatránilo)	2 días	
Xarelto (rivaroxaban)	2 días	
Eliquis (apixaban)	2 días	