

## Hoja de información sobre educación para diabéticos y medicamentos GLP1

Si se somete a estos procedimientos tendrá que saltarse al menos una comida, lo que requiere atención extra y planificación especial para que pueda controlar el azúcar en sangre. Deberá controlar su nivel de azúcar en sangre con mayor frecuencia. Compruébelo más seguido y antes de acostarse el primer día de preparación.

**Verifique su nivel de azúcar en sangre si experimenta algún síntoma de nivel bajo o muy alto de azúcar: mareos, confusión, dificultad para concentrarse, aumento de la sed, hambre, visión borrosa o dolor de cabeza.**

Consulte la hoja de INSTRUCCIONES PARA PACIENTES CON DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS. Es importante que siga controlando los carbohidratos/azúcares durante la preparación: intente ingerir 45 gramos de carbohidratos en los líquidos durante las comidas. Trate de consumir entre 15 y 30 gramos de carbohidratos al consumir snacks mientras toma líquidos.

**Instrucción para los medicamentos durante la preparación: utilice la tabla para la instrucción.**

**Póngase en contacto con nosotros si su medicamento no figura en la lista.**

Medicamento	Día anterior al procedimiento (primer día de preparación)			Día del procedimiento
	Mañana	Almuerzo/cena	Al acostarse	
<b>Actos</b> (pioglitazona) <b>Glucophage</b> (metformina) <b>Farxiga</b> (dapagliflozina) <b>Invokana</b> (canagliflozina) <b>Januvia</b> (sitagliptina) <b>Janumet</b>	Tome dosis habitual	Tome dosis habitual	-	<b>Tome su dosis habitual</b>
<b>Amaryl</b> (glimepirida) <b>Glucotrol</b> (glipizida) <b>Glucotrol XL</b> <b>Jardiance</b> (empagliflozina) <b>Ozempic, Wegovy, Rybelsus</b> (semaglutida) <b>Trulicity</b> (dulaglutida) <b>Victoza, Saxenda</b> (liraglutida) <b>Bydureon y Byetta</b> (exenatida) <b>Adlyxin</b> (lixisenatida)	No tome	No tome	No tome	<b>No tome</b>
	<b>Si se toman semanalmente, los medicamentos resaltados/GLP-1 deben suspenderse 1 semana antes de la cita. Si se toman diariamente, deben suspenderse el día de la cita.</b>			
<b>Lantus o Levemir</b>	Tome dosis habitual	-	Tome dosis habitual	<b>Tome media dosis habitual</b>
<b>Humalog, Novolog, insulina común o NPH</b> *Si utiliza un esquema móvil, puede continuar	Tome media dosis habitual	Tome media dosis habitual	-	<b>No tome</b>
<b>Bomba de insulina</b>	Póngase en contacto con su endocrinólogo para conversar sobre el manejo de la bomba durante la preparación y el procedimiento			<b>Contacte con el endocrinólogo</b>